

Hiperaltam



4290

LOSARTÁN POTÁSICO 50 mg.

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS - VÍA ORAL

FÓRMULA

Cada comprimido recubierto contiene:

Losartán Potásico 50 mg.
Excipientes C.S.

MECANISMO DE ACCIÓN:

El Losartán es un antagonista de los receptores de la angiotensina II con actividad antihipertensiva debida principalmente a un bloqueo selectivo de los receptores AT1 que favorece la reducción del efecto presor de la angiotensina II.

INDICACIONES TERAPÉUTICA:

Losartán Potásico está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial, particularmente cuando exista intolerancia o tos por el uso de IECA, Insuficiencia cardiaca. Infarto agudo del miocardio. Prevención y tratamiento de la nefropatía diabética, solo en combinación con otros agentes antihipertensivos.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la droga.

Embarazo: El Losartán y otros IECA; potencialmente riesgoso ha sido asociados a toxicidad fetal en humanos.

Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.

Diabetes Mellitus: Disminución de la sensación subjetiva de hipoglucemia en pacientes diabéticos de tipo I.

REACCIONES ADVERSAS:

Escasa tos y angioedema de mucho menor frecuencia en los IECA
Hipotensión arterial, específicamente cuando se asocia a diuréticos
Hiperpotasemia, en la insuficiencia renal o con el uso concomitante de diuréticos ahorradores de potasio. Trastornos del gusto, en todas las cosas, el sentido del gusto se normaliza tras suspender el tratamiento de Losartán.

Pancreatitis, Migraña, mareos, rash cutáneo, fátiga, mialgias, calambres, congestión nasal y trastornos del sueño son infrecuentes y con una incidencia semejante al placebo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda administrar con precauciones en pacientes con insuficiencia renal o hepáticas grave, estenosis de la arteria renal o antecedentes de alergias, iniciar el tratamiento con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca o deplecionados de sodio o volumen (tratamiento con diuréticos o dietas hiposódicas estrictas, antecedentes recientes de vómitos o diarrea durante periodos prolongados), pues puede producir un cuadro de hipotensión excesiva.

INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS

Los AINE disminuyen su efecto. Diuréticos tiazídicos y furosemida potencian su efecto hipotensor. La Administración conjunta con diuréticos ahorradores de potasio puede determinar hiperpotasemia

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

Salvo mejor criterio facultativo.

Dosis inicial en adultos y adulto mayores 50 mg /día en 1 o 2 tomas.

Dosis de mantenimiento: 25 - 100 mg / día en 1 o 2 tomas.

SOBREDOSIS

Tratamiento orientado inicial a la sobredosificación, luego de la cuidadosa evaluación del paciente de la valoración del tiempo transcurrido de la ingesta o administración, de la cantidad de tóxicos ingeridos descartados la contradicción de ciertos procedimientos, el profesional decidirá la realización o no al tratamiento general del rescate; vómito o lavado gástrico, carbón activado, purgante salino (45 o 60 min, luego de CA) hemodiálisis antídotos específicos, si existen.

Los datos disponibles de sobredosificación de Losartán en humanos son limitados. La manifestación parasimpática (vegal). Si se produce produce hipotensión sintomática, debería instituirse tratamiento. Ante la eventualidad de una sobredosificación, recurrir **al Centro Nacional de Toxicología del Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni - Tel.: 220 418 o el 204 800 (int. 011)**

PRODUCTO MEDICINAL

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO (15°C - 30°C)
VENTA BAJO RECETA**

ELABORADO POR:



Planta Industrial: Ruta 1 Km 24,5 – J.A. Saldívar - Paraguay- Tel: 021-339 6883

Casa Central: Mcal. López 1053 esq. Juan de Mena - Tel: 021 226700

Director Técnico: Q.F.Teresa Goiris - Reg. Prof. N° 1691