

NORSOL

MEBENDAZOL

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO COMPRIMIDOS RANURADOS - SUSPENSIÓN VÍA ORAL

FÓRMULA:

Comprimidos ranurados

Cada comprimido ranurado contiene:

Mebendazol..... 100 mg.
Excipientes.....c.s.

Suspensión

Cada 5 mL de suspensión contiene:

Mebendazol..... 100 mg.
Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiparasitario de amplio espectro.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Enterobirus vermicularis (oxiuro) – Ascaris lumbricoides (lombriz) – Trichuris trichiura (Tricocéfalo) – Ancylostoma doudenale (anquilostoma) – Necator americanus (necator) – Strongyloides stercolaris – Taenia spp.

MECANISMO DE ACCIÓN:

El mebendazol es un antihelmíntico de amplio espectro que actúa inhibiendo la captación de glucosa por los helmintos. De esta forma, al no poder captar la glucosa exógena, disminuye la formación de A.T.P. imprescindibles para las funciones vitales de los parásitos, especialmente la reproducción.

FARMACOCINÉTICA:

El mebendazol es una droga administrada por vía oral, actúa directamente sobre los parásitos, eliminando los mismos, y la absorción del mebendazol hacia el torrente sanguíneo es prácticamente despreciable (0,1% a 0,4% de la dosis total administrada), por lo que su toxicidad es nula.

Aún en casos de parasitosis mixta, en la primera cura parasitaria con mebendazol se obtiene una curación en más del 90% de los casos.

CONTRAINDICACIONES:

No debe ser administrado durante el embarazo.

RESTRICCIONES DE USO:

Uso Profesional.

POSOLOGÍA:

Es administrado en dosis fijas, es decir las mismas para adultos y niños.

Adultos: 1 comprimido dos veces por día, durante 3 días.

Niños: 1 cucharita dos veces por día, durante 3 días.

En pacientes con teniasis debe administrarse 200 mg. o sea 2 comprimidos o 2 cucharitas dos veces por día, durante 3 días, es decir una doble dosis.

Con el mebendazol, no se precisa un régimen dietético especialmente, ni la posterior administración de laxantes.

SOBREDOSIS:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, recurrir al **Centro Nacional de Toxicología del Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni. Tel.: 220 418 o 204 800 (int. 011).**

PRESENTACIÓN :

Comprimidos ranurados: Caja conteniendo 6 comprimidos ranurados.

Suspensión : Caja conteniendo frasco x 30 mL.

PRODUCTO MEDICINAL
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO (15°C - 30°C)
VENTA BAJO RECETA

ELABORADO POR:



Planta Industrial: Ruta 1 Km 24,5 – J.A. Saldívar - Paraguay- Tel: 021-339 6883

Casa Central: Mcal. López 1053 esq. Juan de Mena - Tel: 021 226700

Director Técnico: Q.F.Teresa Goiris - Reg. Prof. N° 1691