

Capsula - Vía Oral

PROCAINA - ADENOSINA - HEMATOPORFINA VITAMINAS

FÓRMULA:

Cada cápsula roja contiene:

Procaina HCl.....	45,0 mg.
Hematoporfina.....	4,0 mg.
Monofosfato de Adenosina.....	5,0 mg.
Excipientes.....	C.S.

Cada cápsula amarilla contiene:

Vitamina B1	2,0 mg.
Vitamina B2.....	2,0 mg.
Vitamina B6.....	12,0 mg.
Vitamina C	50,0 mg.
Vitamina E	30,0 mg.
Hesperidina	50,0 mg.
Excipientes.....	C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Astenia adinamia, falta de concentración, personas con reposo prolongado, envejecimiento precoz, caída de cabello, activa la capacidad de rendimiento tanto corporal como anímico con un aumento de vitalidad actúa contra la debilidad de memoria, nerviosismo, cansancio y desgano para el trabajo, combate la calcificación arterial y trastornos de la circulación, mejora el estado general y proporciona energía para superar el ajetreo diario.

DOSIFICACIÓN:

Tomar durante un largo periodo sin interrupción para conseguir un efecto palpable. Una cura debe durar por lo menos tres meses. Después de un descanso de 3-4 semanas se recomienda repetirla. Diariamente después del desayuno se tomarán una cápsula roja y otra amarilla, con un poco de líquido.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes, pacientes con aleteo auricular, fibrilación auricular y taquicardia, pacientes con bloqueo atrioventricular de segundo o tercer grado, pacientes asmáticos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Para que la acción del medicamento sea efectivo debe hacerse el tratamiento por 3 meses mínimo. Las vitaminas no son sustitutos de los alimentos, se debe ingerir una alimentación adecuada con los tres grupos de alimentos básicos. No exceder de la dosis recomendada.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS:

No se conocen.

RESTRICCIONES DE USO:

No debe ser usado en pacientes con bloqueo cardiaco, Lupus eritematoso sistémico y enfermedades orgánicas cardiacas severas. Hipotensión.

CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar fresco y seco (15° a 30°C). Mantener fuera del alcance de los niños.

SOBREDOSIS (SIGNOS, SÍNTOMAS, CONDUCTA Y TRATAMIENTO):

La ingestión de megadosis, puede causar una neuropatía periférica, con déficit en distribución guante - calcetín incluyendo una ataxia sensitiva progresiva y una alteración grave de las sensaciones de posición y de vibración. Los sentidos del tacto, la temperatura y el dolor se encuentran menos afectados. Los sistemas nerviosos motor y central suelen estar intactos. El diagnóstico es clínico, el tratamiento consiste en suspender la administración. La recuperación es lenta y para algunos pacientes incompleta. En caso de sobredosis recurrir al **Centro Nacional de Toxicología del Hospital de Trauma Pro. Dr. Manuel Giagni. Tel.: 220 418 o 204 800 (int. 011).**

PRESENTACIÓN:

Caja con 20 cápsulas (10 cápsulas amarillas y 10 cápsulas rojas).

Caja con 40 cápsulas (20 cápsulas amarillas y 20 cápsulas rojas).

PRODUCTO MEDICINAL
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO (15°C - 30°C)
VENTA BAJO RECETA

ELABORADO POR:



Planta Industrial: Ruta 1 Km 24,5 – J.A. Saldívar - Paraguay- Tel: 021-339 6883

Casa Central: Mcal. López 1053 esq. Juan de Mena - Tel: 021 226700

Director Técnico: Q.F.Teresa Goiris - Reg. Prof. N° 1691