

Suavesan[®]

Picosulfato de sodio 5 mg.



16 cm.

Laxante de Contacto
PRODUCTO MEDICINAL
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO (15°C - 30°C)
Venta Libre en Farmacia.
Autorizado por la D.N.V.S. del M.S.P.y B.S.
Certificado N° 17789-01-EF
ELABORADO POR:
LUIS CASSANELLO S.A.I.C.
Planta Industrial: Ruta 1 km 24,5 - J.A. Saldívar - Paraguay
Tel.: 021 3396883
Casa Central: Mcal. López 1053 esq. Juan de Mena
Tel.: 021-226700
Director Técnico: Q.F. Teresa Goñis Reg. Prof. N° 1691
Luis Cassanello

Suavesan[®]
Picosulfato de sodio 5 mg.
Vía Oral
sobre por 4 comprimidos ranurados

Suavesan[®]
Picosulfato de sodio 5 mg.
Vía Oral
sobre por 4 comprimidos ranurados

Laxante de Contacto
Restauración fisiológica
de la evacuación intestinal.



7 184 02228 1103793 1

Cassanello[®]
Luis Cassanello S.A.I.C.

7 cm.

Modificado 31/03/2022

Suavesan[®]

Picosulfato de sodio

COMPRIMIDOS RANURADOS

FÓRMULA:

Cada comprimido ranurado contiene:

Picosulfato de sodio..... 5 mg.

Excipientes..... c.s.

MECANISMO DE ACCIÓN:

El Suavesan actúa desde la luz intestinal por su mecanismo de ósmosis atrayendo agua hasta el bolo fecal, esto hace que el mismo aumente su volumen estimulando así el reflejo defecatorio. El Suavesan por su acción segura y carente de efectos secundarios puede ser utilizado en todos los casos de estreñimiento espástico, inclusive por tiempo prolongado, pues no produce hábito ni absorbe al torrente sanguíneo, lo cual hace que pueda ser administrado sin inconveniente alguno tanto en niños como en mujeres gestantes.

Ventajas del Suavesan

- Restauración fisiológica de la evacuación intestinal.
- No se absorbe, por lo cual puede ser administrado con absoluta confianza en embarazadas y niños.
- No provoca hábito ni acostumbriamiento.
- Carece de efectos secundarios.

INDICACIONES:

Estreñimiento habitual crónico; reeducación de la función evacuadora en adolescentes y niños; atonía intestinal; constipación infantil y de las gestales; vaciamiento intestinal pre y post operatorio; preparación para la radiología intestinal; hemorroides; otros procesos proctológicos.

CONTRAINDICACIONES:

Menstruación, embarazo, lactancia, cuadro agudo de abdomen, apendicitis.

REACCIONES ADVERSAS:

Solo en casos excepcionales se han presentado un efecto laxante mayor al deseado, que se elimina con simples antidiarreicos o parasimpaticomiméticos. Dolores crónicos, deposiciones mucosas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No administrar en casos de sospechas de apendicitis, también en caso de hipersensibilidad a la droga. No debe tomarse en continuidad durante largo periodo. El uso excesivo y prolongado puede producir desequilibrio de los electrolitos e hipotasemias.

RESTRICCIONES DE USO:

Es un purgante muy potente y puede producir irritación intestinal.

INTERACCIONES:

Riesgo mayor de desequilibrio electrolítico con diuréticos, corticosteroides.
Aumenta sensibilidad a glucósidos cardíacos si se produce desequilibrio electrolítico.
Acción reducida por antibióticos.

SOBREDOSIS:

Puede producir cólicos, deposiciones mucosas y diarreas. Se actuará con infusión de líquidos y electrolitos, agentes atropínicos, ingesta de agua, caldo, ect. Consultar con su médico o recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni
Tel: 220 418 - 204 800 int. (011)

POSOLÓGIA:

Adultos: 1 comprimido ranurado por la noche con un vaso de agua.

La dosis se ingerirá preferentemente antes de acostarse, produciéndose el efecto a la mañana siguiente.

PRESENTACIÓN:

Suavesan - Comprimidos ranurados: Exhibidor con 25 sobres x 4 comprimidos ranurados.

